



QUESTIONS DE LA DT 150

Les réponses vous seront fournies dans le prochain numéro.

MORTALITÉ NÉONATALE EN ÉLEVAGE CANIN

Question 1 - Quel est actuellement le taux habituel de mortalité entre la naissance et le sevrage chez le chiot ?

- < 5 %
- 5 à 15 %
- 15 à 25 %
- 25 à 35 %
- > 35 %

Question 2 - A partir de quel niveau de glycémie le risque de mortalité néonatale augmente significativement ?

- 1,5 g/L
- 1,2 g/L
- 0,9 g/L
- 0,6 g/L

Question 3 - A quel niveau de score APGAR le risque de mortalité néonatale augmente-t-il significativement ?

- Score de 10
- Score de 8
- Score de 6
- Score de 4

FOCUS : Prélèvements et erreurs

Question 1 - Le stress peut modifier un bilan biologique chez le chien et le chat. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui est exacte :

- 1- Le stress peut être à l'origine d'une hyperglycémie, d'une éosinophilie chez le chat ?
- 2- Le stress peut être à l'origine d'une hyperglycémie et d'une lymphocytose chez le chien ?
- 3- Le stress peut être à l'origine d'une polyglobulie, d'une thrombocytose et d'une neutrophilie chez le chien ?
- 4- Le stress peut être à l'origine d'une hyperglycémie, d'une augmentation de la concentration en fructosamine et d'une lymphocytose chez le chat ?

Question 2 - La prise récente d'un repas peut modifier un bilan biologique chez le chien et le chat. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui est fautive :

- 1- Un repas récent peut être à l'origine d'une hyperglycémie ?
- 2- Un repas récent peut être à l'origine d'une hypertriglycéridémie et d'une augmentation artéfactuelle de l'albuminémie ?
- 3- Un repas récent peut être à l'origine d'une hyperglycémie, d'une hypertriglycéridémie avec un plasma lactescent, d'une hyperurémie, et d'une hyperinsulinémie ?
- 4- Un repas récent peut être à l'origine d'une hyperglycémie, d'une hypertriglycéridémie, d'une hypourémie, et d'une augmentation de la concentration en acides biliaires ?

Question 3 - La prise de médicaments peut modifier un bilan biologique chez le chien et le chat. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui est exacte :

- 1- Les corticoïdes peuvent être à l'origine d'une augmentation de l'activité plasmatique en CK (Créatine Kinase) ?
- 2- Le bromure de potassium, anti-épileptique, peut augmenter artéfactuellement la concentration plasmatique en chlore ?
- 3- Le bromure de potassium, anti-épileptique, peut augmenter artéfactuellement la concentration plasmatique en magnésium ?
- 4- Une anesthésie ne modifie pas le bilan biologique d'un animal ; les prélèvements pour un bilan hématologique peuvent donc être réalisés au cours d'une anesthésie gazeuse ?

Question 3 - Pour chaque type d'analyse (hémostase, hématologie ou biochimie), un ou deux tubes avec anticoagulants peuvent être utilisés. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui est exacte :

- 1- Pour un hémogramme, un tube EDTA ou CTAD peuvent être utilisés ?
- 2- Pour un bilan biochimique classique, seul le tube sec peut être utilisé ?
- 3- Pour réaliser des temps d'hémostase, un tube EDTA ou citrate peuvent être utilisés ?
- 4- Pour un bilan biochimique classique, un tube héparine ou citrate peuvent être utilisés ?

GESTION DE LA DOULEUR

Question 1 - Une chienne, énervée, devant subir une césarienne, peut-elle être prémédiquée avec de la méthadone ?

Question 2 - Des AINS peuvent être administrés à une femelle au cours de la césarienne ?

NAC : Gestion ponte Psittacidés

Question 1 : Concernant la prévention médicale et environnementale de la ponte chez les psittacidés :

- a. Une alimentation pauvre en gras favorise la ponte ?
- b. L'acétate de desloréline seul arrête la ponte dans 100 % des cas ?
- c. L'implant de desloréline a une durée d'efficacité de 1 an ?
- d. Les caresses sur le dos favorisent la ponte ?

Question 2 : Concernant la prévention chirurgicale de la ponte chez les psittacidés :

- a. La salpingo-hystérectomie est une procédure courante en convenance chez les psittacidés ?
- b. La salpingo-hystérectomie par coelioscopie est possible en convenance chez les psittacidés ?
- c. L'ovariectomie seule est bien supportée chez les psittacidés ?