



QUESTIONS DE LA DT 155

Les réponses vous seront fournies dans le prochain numéro.

ACTUALITÉ DIAGNOSTIQUE :

Fibroadénomatose et mastose

Question 1 - Quelles sont les hormones impliquées dans la pathogénie de la fibroadénomatose mammaire du chat ?

Question 2 - Quelle est la tranche d'âge habituelle des chattes affectées par la fibroadénomatose ?

Question 3 - Vrai ou faux ? : Lors de fibroadénomatose, une seule mamelle est atteinte.

TRAITEMENT : Fibroadénomatose et mastose

Question 1 - Vrai ou faux ?

Lors de fibroadénomatose, une exérèse mammaire est le traitement de première intention et doit être réalisée dès que le diagnostic est établi.

Question 2 - Vrai ou faux ?

Lorsque la fibroadénomatose ne répond pas au traitement par l'aglépristone, une ovariectomie permet la régression des lésions mammaires.

CONDUITE À TENIR : Rémanence ovarienne

Question 1 - L'une des propositions suivantes est fausse. Laquelle ?

1. Lorsqu'une rémanence ovarienne est suspectée chez une chatte, le choix des examens complémentaires à réaliser repose sur le stade du cycle œstral de l'animal.
2. Lors de rémanence ovarienne, des signes d'œstrus peuvent n'être observés que plusieurs années après l'ovariectomie.
3. Une rémanence ovarienne peut se traduire par une fibroadénomatose mammaire.
4. Chez le chat, une rémanence ovarienne est généralement associée à une cystite.
5. Lors de rémanence ovarienne, le tissu ovarien résiduel est généralement situé en position anatomique.

Question 2 - L'une des propositions suivantes est fausse. Laquelle ?

Lorsqu'une rémanence ovarienne est suspectée chez une chatte, la présence de tissu ovarien résiduel est confirmée dès lors que :

1. la valeur de la progestérone plasmatique est supérieure à 2 ng/ml.

2. une valeur de LH sérique est supérieure à 1 ng/ml.
3. des cellules kératinisées sont présentes sur le frottis vaginal.
4. la valeur de l'œstradiol plasmatique est supérieure à 20 pg/ml.
5. la valeur de l'AMH sérique est élevée.

FOCUS : Etude TEST

Question 1 - Quelles sont les particularités pharmacodynamiques du torasémide d'intérêt pratique pour le traitement de l'insuffisance cardiaque canine ?

Question 2 - Quelles sont les principaux résultats à retenir de l'étude clinique TEST (JVIM 2017) ?

RURAL : Vaccination du veau

Question 1 - Quel est le délai recommandé entre le rappel de vaccination et le vêlage ?

Question 2 - Quel est l'agent pathogène qui a la plus forte prévalence en Europe ?

NAC : Dilatation gastrique chez le lapin

Question 1 : A propos de la fluidothérapie chez le lapin.

- a. Les besoins d'entretien sont moins élevés que chez le chien
- b. Les désordres acido-basiques sont fréquents chez le lapin en dilatation gastrique
- c. L'acidose métabolique est plus fréquente en cas d'obstruction haute
- d. L'alcalose métabolique est plus fréquente en cas d'obstruction basse

Question 2 : A propos des méthodes de décompression de l'estomac chez le lapin

- a. Le sondage gastrique est déconseillé chez le lapin
- b. Il est recommandé de réaliser une laparotomie dès l'admission
- c. Le sondage gastrique ne peut être réalisé que sous anesthésie
- d. La laparotomie est recommandée si la dilatation gastrique récidive après sondage